


## Rückschnittgruppe 2

### Jährlich im November/Dezember leicht zurückschneiden

(alle Triebe um die Hälfte einkürzen).



Anwendung bei Clematis-Hybriden, die zweimal im Jahr blühen. In der Sortenliste sind diese Clematis mit Blühterminen von 5/6 (Mai-Juni) u. 8/9 (Aug.-Sept.) angegeben. Ein **starker Rückschnitt ist alle 4-5 Jahre empfehlenswert** um die Pflanzen zu verjüngen.

Alle Hybriden dieser Rückschnittgruppe blühen im Frühjahr im unteren Bereich an den Kurztrieben die dem „Vorjährigen Holz“ entspringen. (Ähnlich Rückschnittgruppe 1)

Nach der ersten Blüte im Frühjahr werden neue Triebe (Langtriebe) ausgebildet, die dann im Sommer/Spätsommer erneut blühen.

Die **meisten „gefüllt blühenden Hybriden“ blühen nur an diesen Kurztrieben im Frühjahr gefüllt!**

Die zweite Blüte im Sommer/Spätsommer

ist bei solchen Sorten dann ungefüllt.

(Es gibt einige Ausnahmesorten die auch während der zweiten Blüte gefüllt blühen, z.B. Multi-Blue)

Typisch für diese Sorten ist der reiche Fruchtansatz nach der ersten Blütezeit. Diese Früchte sollte man mit dem darunterliegenden Blattpaar abschneiden und entfernen. Anschließend wachsen schnell neue Triebe nach, die dann in ca. 6 Wochen erneut üppig blühen!