


### Rückschnittgruppe 3

#### Jährlich im November/Dezember kräftig zurückschneiden

(auf 20 bis 50cm über dem Erdboden). Anwendung bei zahlreichen Hybriden und Wildarten, die ausschließlich im Sommer blühen.



Alle diese Arten und Sorten bilden Langtriebe aus, die mit einer Masse von Blüten enden. Hierzu gehören z.B. C. viticella oder C. Hybr. Jackmanii. Ohne Rückschnitt verkahlt diese Clematis von unten her zusehends.

Schadet an einigen Pflanzpositionen sicher nicht z.B. zu Gehölzen oder Kletterrosen, d.h. die Rückschnitthöhe kann individuell an die örtlichen Verhältnisse angepasst werden.

### Rückschnittgruppe 2/3

So bezeichnete Clematis können sowohl in die eine oder andere Schnittgruppe eingeordnet werden. Es handelt sich hierbei um Kreuzungen aus Clematis der Rückschnittgruppen 2 und 3.

#### **Profitipp:**

**Handhabung wie Schnittgruppe 2 bedeutet frühe Blütezeit ab Mitte Mai / Anfang Juni.**

**Handhabung wie Schnittgruppe 3 bedeutet Blütezeit ab Mitte / Ende Juni**